

sées, et on observe alors sur chaque élytre 6 côtes à peu près semblables (var. **homolophus**, n. var.).

La série que j'ai sous les yeux montre tous les passages entre le type et la variété extrême.

E. diacritus se distingue nettement d'*E. opacus* : 1^o par la disposition des côtes des élytres qui atteignent toutes la base, tandis que chez *E. opacus* la 1^{re} côte s'efface sur la moitié basilaire de l'élytre et la 2^e vers les trois quarts. On observe en outre chez *E. diacritus* deux petites élévations juxtascutellaires (une de chaque côté de l'écusson); — 2^o par la série de côtes intermédiaires dont je n'ai jamais vu de vestiges chez *E. opacus*; — 3^o par le reflet irisé, dont je n'ai jamais observé la moindre trace chez *E. opacus* et qui se retrouve chez tous les individus d'*E. diacritus* que j'ai examinés.

Types : Madagascar-Nord, probablement versant S.-E. du massif Antankara, province de Vohémar; quatre exemplaires (collection Ch. ALLUAUD).

Description d'une espèce nouvelle du genre *Trichius* Fabr.

[COL. SCARABAEIDAE]

par A. BOURGOIN.

Trichius Duporti, n. sp. — ♀. *Capite*, thorace et scutello cupreo-micante; capite valde punctato, inter oculos strigoso; clypeo fortiter bilobato; thorace regulariter et dense punctato; scutello lateribus valde punctato. *Elytris* nigris, nitidis, bico-statis, striolatis, flavo bifasciatis. *Corpore* subtus pedibusque cupreis, nitidis, flavo-pilosis; pygidio cupreo micante, albo piloso-bimaculato.

Taille et forme de *T. bifasciatus* Mos., mais entièrement cuivreux métallique, excepté sur les élytres. Front très ponctué, assez finement en arrière, mais à points devenant confluent et formant des stries dans l'espace interoculaire. Partie antérieure des clypéus ponctué comme le front et fortement bilobée; pronotum convexe, densément et assez régulièrement ponctué, avec une ligne lisse au milieu et une fossette couverte de courtes soies blanchâtres vers le milieu de chaque côté.

Côtés du pronotum rebordés, presque anguleux vers le milieu,

rétrécis en ligne droite en avant et sinueusement en arrière où ils forment avec le bord postérieur un angle bien net, presque droit.

Élytres noirs, assez brillants, avec la suture et deux côtes lisses. Les intervalles des côtes couverts de stries obliques très fines et très serrées.

Pygidium striolé transversalement, avec deux petites touffes de poils blanchâtres.

Pièces thoraciques striolées latéralement et pubescentes; abdomen ponctué et pubescent, sauf au milieu des quatre premiers segments. Tibias antérieurs à bord externe tranchant, élargi à partir du milieu; intermédiaires et postérieurs ayant, vers les deux tiers de leur longueur, une saillie externe peu marquée.

Tonkin : Chapa (L. DUPORT).

Une ♀ (coll. A. BOURGOIN).

Description d'un genre et d'une espèce nouvelle de *Meloidae* [COL.]

par Pierre DENIER.

Eolydus, nov. gen. (1). — Gen. *Lydo* affinis. *Caput convexum, macula frontali orali. Pronotum subquadratum, convexum, margine laterali antice haud deleto. Tibiarum posticarum internum calcar breve, spiniforme, arcuatum: externum validum, dilatatum, oblique truncatum. Unguiculi usque ad basin fissi, haud pectinati.*

Se rapproche des *Halosimus* et des *Lydus* du groupe de *L. praeustus* Red t. par la présence d'une tache frontale rouge. S'éloigne de ces deux genres par le pronotum entièrement rebordé et surtout par les ongles non pectinés.

E. atro-coeruleus, n. sp. — *Elongatus, subnitidus, atro-coeruleus. Caput latum, convexiusculum, dense et grosse punctatum, macula frontali rubra. Antennae breves, art. 1° rufido, sut elongato, 2° brevissimo, articulis 3-4 latitudine paulo longioribus, 5-10 crassiusculis, sensim brevioribus, ultimo articulo longiore, piriformi. Pronotum nitidulum, subquadratum, convexum, antice et longius postice attenuatum, angulis rotundatis, rugoso-punctatum, in disco leviter bimpresum. Scutellum magnum, medio carinatum. Elytra prope basin pronoto paulo minus duplo latiora, apicem versus sensim leviter dilatata, lineis tribus elevatis*

(1) Ἠώς, Orient; *Lydus*, nom générique.